

支子支子支子支子支子支子支子支子



醫心方卷第廿二

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

任婦脉局月禁法第一 婦人任婦身法第二

婦人任婦禁食法第三 治任婦惡阻方第四

治任婦養胎方第五 治任婦悶膈方第六

治任婦胎動不安方第七 治任婦數落胎方第八

治任婦胎隨血不止方第九 治任婦隨胎腰痛方第十

治任婦胎上迫心方第十一 治任婦漏胞方第十二

治任婦下黃汁方第十三 治任婦損作舉重去血方第十四

治任婦卒走高墮下血方第十五 治任婦為男所動欲死方第十六

治任婦胸煩吐食方第十七 治任婦心痛方第十八

治任婦心脈痛方第十九 治任婦腹痛方第二十

治任婦腰痛方第二十一 治任婦脹滿方第二十二

治任婦體腫方第二十三 治任婦下利方第二十四

治任婦淋病方第二十七 治任婦遺溺方第二十八

治任婦霍亂方第二十九 治任婦癰方第三十

治任婦溫病方第三十一 治任婦中惡方第三十二

治任婦欬嗽方第三十三 治任婦時病令子不落方第三十四

治任婦日月未至欲產方第三十五 治任婦胎死不出方第三十六

治任婦欲去胎方第三十七

任婦脉面月禁法第一



沈休女 過溪一 五二

治任婦癰方第三十

治任婦中惡方第卅二

治任婦時病令子不落方第卅四

治任婦胎死不出方第卅六

任婦脉面月禁法第一

產經云黃帝問曰人生何如以成汝伯對曰人之始生之於實之

乃始為胎之容无有擾乃為始收任身一月曰胚又曰胞二月曰

胎三月曰血脉四月曰具骨五月曰形成七月曰毛髮生

八月日腫子  
九月日穀入胃  
十月日兒出生也  
今安太素經曰  
一月膏二月

脉三月胞四月胎五月勸六月  
 骨七月成八月動九月躁十月生  
 夫婦人任身十二經脉主胎養胎當月不


可針灸其之脈也不禁皆為傷胎後賊母也不可不慎宜依月晷

而避之懷身一月名曰始形飲食必精酸味無御大夫無食辛

是謂始載<sup>負</sup>也。病源論云：一月足一狀陰脈養不可針灸其經也。厥陰


者是肝之主筋亦不宜為力妄寢心安靜无令恐畏

足厥陰肝脉圖



右肝脉穴自大敦上至陰廉者十二穴又募二穴名期門又輸  
二穴在脊第九椎節下兩旁各一寸半上件諸穴並不可  
針灸之致死






懷身二月名曰始膏无食辛躁居必静虔男子勿劳百節

骨間脊病是謂始藏也

病源論云勿食辛腥之物二月  
之時兒成精

二月是廿陽

脉養不可針灸其經也少陽者內屬於膽當慎謹勿驚之



各一寸半上件諸君並不可犯之

懷身三月名曰胎當之時未有定儀見物而化是故

應見王公后妃公主好人不欲見倭者件儒醜惡瘦人

援无後食苗薑菟宗思欽有菓花激味酸殖花无食辛而煎








半上件諸症並不可犯之

懷身四月始受水精以盛血脉其食稻稷其養魚鳥是謂盛  
血氣以通耳目而行經絡也四月手少陽脉養不可針其經  
也手少陽内属上睪靜安形體和順心志節飲食之  
手少陽三焦脉面




右三焦脉自兩腋上至消灤各十二穴又暮一穴在當脊下二寸  
右為石門又愉二穴在脊第十三椎節下兩傍各一寸半  
上件諸症並不可犯之

懷身五月始受火精以盛血氣嬰兒沐浴浣衣身居堂必  
厚其衣朝吸天光以避寒飢其食稻麥其養牛羊和菜羹  
調以五味是謂養氣以定五藏者也五月足大陰脉養不可針  
灸其經也大陰者内属於脾無大飢無甚飽无食乾燥无自炙熱


大勞倦也

足大陰脾脉面






大勞倦也  
足大陰脾脉面



右脾脉起自<sup>助</sup>陰白上至臍門各十二穴又募二穴名章門在季  
肋端側卧取之又輸二穴在脊第十一椎節下兩傍各一寸半  
上件諸穴並不可犯之

懷身六月始受金精以成筋骨勞身无虞出遊於野數觀走大馬宜  
食鷲鳥猛獸是理要湊理細筋以養其介以坚其骨接月也  
六月足陽明脉養不可針矣其經也陽明内属於脾調和五味食  
甘之和无大飽  
足陽明胃脉面



右胃脉自<sup>助</sup>陰白上至臍門各十六穴又募一穴名中脘在臍  
上五寸








右肺脉穴自少高上至天府各九穴又募二穴在背脊中府在兩乳上三肋間陷者中又輸二穴在背第三推節下兩旁各一寸半上件諸穴並不可犯之

懷身八月始受土精以成膚革<sup>草</sup>和心靜息无使氣挫是謂密濇理而光澤<sup>澤</sup>顏色也

八月手陽明脉養不可針矣其經也陽明者內屬於大腸无食燥物无忍大起

手陽明大腸脉圖




右大腸脉穴自高陽上至解體各十四穴又募二穴在脊兩旁各二寸半右名天樞左名穀門又輸二穴在脊第十六推節下兩旁各一寸半上件諸穴並不可犯之

懷身九月始受石精以成皮毛六月府百節莫不畢備飲體食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮多才力也


九月足少陰脉養不可針矣其經也少陰內屬於胃无虞濕冷无著灸衣

足少陰腎脉圖






體食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮多才力也  
 九月足少陰脉養不可針其經也少陰內屬於胃无虞濕  
 冷无著灸衣  
 足少陰腎脉篇




右腎脉自涌泉上至陰谷<sup>十六</sup>又募二穴在腰目中  
 季肋<sup>肋</sup>本使脊中宗前窕之中名京門又輸二穴在脊第  
 十四椎下兩旁各一寸半上件諸穴並不可犯之  
 懷身十月俱已成子也時順天生吸地之氣得大之靈而臨生  
 時乃能啼聲逐天氣是始生也 十月足太陽脉養不可針  
 灸其經也太陽內屬於膀胱无虞濕地无食大熱物  
 足太陽膀胱脉篇



右膀胱脉自至陰上至枕承各十六穴又募一穴在脊  
 下直四寸脊中極又輸二穴在脊第十九椎節下兩旁  
 各一寸半上件諸穴並不可犯之





右膀胱脉自至臑上至肘腋各十六穴又募一穴在脊  
奇  
下直四寸脊中極又輸二穴在脊第十九椎節下兩旁  
各一寸半上件諸穴並不可犯之

### 婦人任婦身法第二

產經云凡任身之時端心正坐清虛如一坐必端席立不邪住行  
必中道卧无横愛舉目不視邪色起耳不聽邪聲口不妄言無  
喜怒憂悲思慮慮和順卒生聖子產无橫難也而諸生子有癰疽  
醜惡者其咎皆在其母豈不可不審詳哉又云文王初任之時其母正  
坐不聽邪言惡語口不妄語正行端坐是故生聖子諸賢母宜可  
慎之又云任身三月未有這儀見物而為化是故應見王后公主好人不  
以不教見僕者侏儒醜惡瘁人猿猴其欲生男者着簪珥旋環  
雄雉乘牡拉馬走田野觀席豹及走馬其欲生女者着簪珥旋環  
珮欲命令子美好者數視白玉美珠觀孔雀食鯉魚欲令子多智  
有力者當食牛心御大麥欲令子賢良者坐无邪席立无偏行  
是謂以外而下像內化者也

千金方云凡受胎三月遂物变化稟質未定故任身三月欲得



以不教見倭者倭儒醜惡癖人獲獲其教生男者操弓矢射  
雄雉乘拉<sup>牡</sup>馬走田野觀席豹及走馬其教生女者著簪珥旋環  
珮欲命<sup>令</sup>子美好者數視白玉美珠觀孔雀食鯉魚教令子多智  
有力者當食牛心御大麥<sup>欲</sup>令子賢良者坐无邪席立无偏行  
是謂以外而<sup>下</sup>像內化者也

千金方云凡受胎三月遂物变化稟質未定故任身三月欲得  
見犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子咸德大師礼樂鐘鼓  
但三軍振陳設焚燒若香口誦詩書居處簡靜割不正不食席  
不正坐禪琴瑟調心神和情性節<sup>嗜</sup>教生子皆長壽无疾

養生要集云婦人<sup>身</sup>集大小行勿至非常之地逆產教人 又云婦孕  
見<sup>產</sup>孺而生兒其四日又云孕婦三月不得南向洗浴胎不安

又云婦孕三月不得南向小便令兒瘡癰 又云婦孕三月不得西  
鏡相照令兒倒產膳夫<sup>任</sup>身勿小向<sup>其</sup>生年上大小便母難

### 婦人任婦禁食法第三

養生要集云婦人任身不得六畜肉令兒不聰明 <sup>一云懷胎</sup>

又云勿食猪肝令胎不生 又云勿食鳧肉令子屑數不酒

見之 又云勿食鷄子干雞魚使子多割 <sup>楊氏產云</sup> 又云勿

不得食魚頭損胎 又云食鯉鯪令兒多割 又云勿食生

薑令子盈 又云勿食干薑桂耳草令胎消胎不安

又云勿飲冰漿令胎不生 <sup>一</sup>又云勿食杏人及契酪破損傷子

又云勿以炙雀并大豆將漿食令胞滿使兒多肝飽 又云勿飲

酒多食雀肉使子心滯精亂 又云食雀肉令兒多所欲

又云勿食雀肉并雀<sup>胎</sup>令<sup>人</sup>雀盲 又云勿食雀并梨子令子短舌

又云康并梅并梅李實食之使人清音 <sup>雀</sup>雀禹錫食經云任



不得食與頭損胎 又云食雞雞令兒多創 又云勿食生薑令子盈 又云勿食干薑桂耳草令胎消胎不安

又云勿飲水漿令胎不生 又云勿食杏人及契酪破損傷子 又云勿以炙雀并大豆漿食令胞滿使兒多肝飽 又云勿飲

酒多食雀肉使子心滯精亂 又云食雀肉令兒多所欲

又云勿食雀肉并雀胎胎令人雀盲 又云勿食雀并梨子令子短舌

又云康并梅并梅李實食之使人清音 雀雀禹錫食經云任

身不可食鳩其子門肥死病於產難故也 朱思簡食經云

勿食猪肉令子瘡瘰元聲 又云飲酒醉令兒癲癇

又云食梨子腹閉寒血結不利千金方 妊娠勿食鱉龜肉令子

頂短 本草食禁云任身食鷄雞害并糯米使子腹中

多虫 楊氏產乳 產經云女人胎任時多食鹹鹹胎閉寒

任身食苦胎乃動任身多食甘胎骨不相着 任身多食酸酸

胎肌宗不成 任身多食辛胎精魂 不守 今案任婦不

二種其若 楊氏產乳之不食猪肉令兒無聲 同在產經

### 治任婦惡阻方第四

病源論云惡阻病者心中憤之頭重眼眩四支沉重懈

惰不飲執作惡聞食氣酸飲酸酸菓實多卧少起世云惡

食 又云惡字是也乃至三月四月以上大劇者吐逆不能自勝

舉也此由婦人本虛氣血氣不足腎氣 又弱兼當風取冷大

過心下有淡水杖之而有娠血既閉水漬於藏之氣不宣故心

煩憤氣逆則遙吐血脉不通經絡否液則四支沉重按風則頭

痛眩故欲有胎而病惡阻所謂欲有胎者其人月水尚未而顏色

肌膚如常但苦沉重憤悶不用食飲不知患所在脉理順時平和



食 又云惡字是也乃至三月四月以上大劇者吐逆不能自勝

舉也此由婦人本虛氣血氣不足腎氣 又弱兼當風取冷大

過心下有淡水杖之而有娠血既閉水漬於臍之氣不宣故心

煩憤氣逆則<sup>吐</sup>逆吐血<sup>脉</sup>不通經絡否液則四支沉重按風則頭

痛眩故欲有胎而病惡阻所謂欲有胎者其人月水尚未而顏色

肌膚如常但苦沉重憤悶不用食<sup>飲</sup>不知患所在脉理順時平和

則是欲有胎也如此經二月日後使覺不通則結胎也

產經云半夏伏苓湯治任身姐病心中憤悶室煩吐逆惡聞食氣

頭重四支百節疼痛沉重多卧少起惡寒汗出疲極黃瘦方

半夏<sup>五兩</sup> 生薑<sup>五兩</sup> 伏苓<sup>三兩</sup> 旋復花<sup>一兩</sup> 橘皮<sup>二兩</sup> 細辛<sup>二兩</sup>

芎藭<sup>二兩</sup> 人參<sup>二兩</sup> 夕藥<sup>二兩</sup> 干地黄<sup>三兩</sup> 澤瀉<sup>二兩</sup> 甘草<sup>二兩</sup>

草<sup>二兩</sup> 凡十二物以水一斗煮取三升分三服若病姐積日

月不得治及服藥冷熱失准病變客熱煩<sup>渴</sup>生瘡者除橘皮細

辛用前胡知母各二兩若愛冷下者除干地黄用桂肉二兩若食少

胃中<sup>虛</sup>據生熱大行閉塞小行赤少者宜加大黃三兩除地黄加薑

一兩餘藥係方服一劑得下後消息 氣力冷熱更增損方調定

即服一劑湯便急將伏苓<sup>丸</sup>令得熟食便強健也 小呂方同之

小呂方云伏苓丸治任身姐病患心中煩悶頭重眩目憎聞飯氣

便飲逆吐胸顛倒四支委熱不自勝持服之即効要先服半夏伏

苓湯兩劑後將伏苓丸也 伏苓<sup>一兩</sup> 人參<sup>一兩</sup> 桂肉<sup>一兩</sup> 干薑<sup>一兩</sup>

半夏<sup>各二兩</sup> 橘皮<sup>一兩</sup> 白朮<sup>二兩</sup> 枳實<sup>二兩</sup> 葛根<sup>一兩</sup> 甘草<sup>二兩</sup>

凡十物搗節蜜和丸如梧子飲服廿丸漸至卅丸日三 產經同之

集驗方治任身二三月惡姐<sup>臨</sup>吐不下食方 產經之竹茹湯

青竹茹<sup>三兩</sup> 生薑<sup>四兩</sup> 半夏<sup>五兩</sup> 伏苓<sup>四兩</sup> 橘皮<sup>三兩</sup> 凡五物切以

水六升煮取三升半分三服 又云治任身 臨吐不食橘皮湯方 橘皮<sup>一兩</sup> 竹茹<sup>一兩</sup> 人參<sup>一兩</sup> 木<sup>各三</sup>



卷之四 婦人經水不調 什參 人參 桂枝 干薑 半夏 各二兩 橘皮 一兩 白朮 二兩 枳實 二兩 葛根 一兩 甘草 二兩

凡十物搗節蜜和丸如梧子飲服廿丸漸至卅丸日三 產經同之 集驗方治任身二三月惡姐臨吐不下食方

青竹茹 三兩 生薑 四兩 半夏 五兩 伏苓 四兩 橘皮 三兩 凡五物切以 水六升煮取二升半分三服 產經之竹茹湯 又云治任身

臨吐不食橘皮湯方 橘皮 竹茹 人參 朮 各三兩 生薑 四兩 厚朴 二兩 凡六物切以水七升煮取二升半分三服

僧深方治婦人任身惡姐醉心胸中冷非痛不能飲食輒吐黃汁方用 人參 干薑 半夏

凡三物分等治下以地黃汁和丸如梧子一服三九日三 今案槩要方云 稍加至十九 產經云人參九神良 醫門方

凡任娠姐病惡食以所思食必愈 近驗圖云金子龍 昨買善端正也

### 治任婦養胎方第五

僧深方云養胎易生丹參膏方 丹參 四兩 人參 二兩 當歸 三兩 芎 二兩 蜀椒 二兩 白朮 二兩

猪膏 一斤 凡六物切以真苦酒漬之夏天二三日於微火 煎當著底杖之年不得離三上三下藥成後去滓以酒酒服如

未核日三稍增可加若有傷動見血瘰如鷄子黃者晝夜之神良任 身七月使可服至坐臥忽生不覺又治生後餘腹痛也

今案產經云 丹參 當歸 芎 白朮 蜀椒 千金方云安胎奠臍法 鯉里二竹生者去

鱗藏粳米一升有相和作糲少著塩加著豉酢敷之日別三過食 之滿十箇 又方取鯉魚長一尺者水自浸內塩煮飲之



未核日三稍增可加若有傷動見血服如鷄子黃者晝夜之神良任

身七月使可服至坐卧忽生不覺又治生後餘腹痛也

今案產經云 止丹參一斤 當歸四兩 芍藥二兩 白朮四兩 蜀椒

四猪腦四斤 千金方云安胎魚臍法 鯉里二斤生者去

鱗藏粳米一升有相和作糲少著塩加著豉酢敷之日別三過食

之滿十箇月 又方取鯉魚長一尺者水自浸內塩煮飲之

本草拾遺云鯉魚肉主安胎之動懷妊身腫煮為湯食之

### 治任婦胸膈方第六

小呂方云任身忽胸膈不識人須更醒之後發亦仍不醒者名為

瘧病亦号子痼也亦号胸膈也治之方急作淡竹瀝汁与之无淡

竹者桂竹亦善後宜眼治瘧膈葛根湯

集驗方云任身恒苦煩悶者此子煩故也治之方時之眼竹瀝隨多

少食

### 治任婦胎動不安方第七

病源論云胎動不安者多自勞役或觸胃冷熱或飲食不適

或居處失宜輕者轉動不安重者便致傷胎

醫門方云凡候胎動法母唇口青者兒死母活唇口中青沫

出者子母俱死口赤舌青沫出者死兒活 又云夫胎動不安

方者飲取汁煮姜姜脹之佳今案博濟安胎方胎動欲隨腹

痛不可忍方苧根去皮切一升銀五兩右以清酒一升水一升

銀五兩右以清酒一升水一升煮取一升溫分四服即止

又云療任娠腹內冷致動不安方 乾薑三兩 芍藥四兩 艾

水六升外煮取二升半分二服 又方 葱白切



醫方云凡胎動過傷母唇口青者兒死母活唇口中青沫

出者子母俱死口赤舌青沫出者死兒活 又云夫胎動不安

方者飲取汁煮姜姜脹之佳今案博濟安胎方胎動欲隨腹

痛不可忍方苧根去皮切外銀五兩右以清酒一升水一升

銀五兩右以清酒一升水一升煮取一升溫分四服即止

又云療任娠腹內冷致動不安方 乾薑三兩 芎二兩 艾二兩

二 水六升煮取二升半分二服 又方 葱白切升

當飯四兩 清酒五升煮取二升半分溫二服大効

又云療任娠忽被驚愕胎向下不安少腹痛連腰並下血方

當飯 芎二兩 阿膠八分 人參六分 大棗十二枚 艾二兩 伏苓十

水七升煮取二升半分三服之相去八九里

槿要方云生地黃一升搗取汁以鷄子白一搯合和飲之良

小品方云治任身腹中冷胎不安方 甘草 當飯二兩 干薑 二兩

大棗十二枚 凡四物以水五升煮取三升三服之 又云治母有勞

契動胎之不安去血手足煩方 生甘草皮 二升 當飯 二兩 芎二兩

黃芩半兩 凡四物以水一斗煮竹皮取六升汁去滓內煎取三

外分三服之 葛氏方云任身卒胎動不安或腰痛或

胎轉捨心或下血不止方 葱白一把以水三升煮令葱熟

飲其汁食葱令盡 本草云一草一把 又方生魚二斤棘米一升調作臛頓食之

楊氏產乳云胎動五六月因驚難較者煎取一升去滓頓服

集驗方云治任身胎動晝夜叫呼口噤唇塞及下利不覺方已

治 艾葉一籃以好酒五升煮取四升去滓更煎取一升一服

口閉者開口灌之藥下即安 僧深方云艾及葉物 一籃者以二升為正

又云治任身二三月至八九月胎動不安腰痛已有所見方

艾葉三兩 阿膠二兩 芎二兩 當飯各三兩 甘草一兩半

切以水八升煮取三升去滓 內膠更上火膠消分三服



集驗方云治任身胎動晝夜叫呼口噤唇塞及下利不覺方已

治 艾葉一握以好酒五升煮取四升去滓更煎取一升一服

口閉者開口灌之藥下即安 僧深方云艾及葉物一握者以二升為正

又云治任身二三月至八九月胎動不安腰痛已有所見方

艾葉 三 阿膠 炙 芎 之 當歸 各三 甘草 一兩半

切以水八升煮取三升去滓 內膠更上火膠消合三服

產經云治任身七八月腰腹痛胎不安汗出逆冷飲食不可下

氣上煩滿四支痺墮當歸湯方 當歸 三 芍藥 二兩

干地黄 三 生艾 一 枳 中 草 二 膠 四兩 生薑 一兩 橘皮

二 右八物切以水一斗煮得三升去滓內膠令烊合四服之

又云任身臨生月胎動不得生方 桑上寄生 五

甘草 二 桂心 五 伏苓 五 右四物以水七升煮得二

升分三服 僧深方云 艾葉一把握酒三升煮取

一升半 頓服安又治產難

錄驗方治胎不安生鯉魚湯方 生鯉魚一頭 重五斤

干薑 二 吳茱萸 一 凡三物切以水一斗皀煮鯉魚五

沸出羹內茱萸取三升服一升日三

治任婦數落胎方第

病源論云陽施陰化故得有胎榮衛和則經養固之故胎得安而

能成長若血氣虛損者子藏為風令所以數值胎任娠而恒腰痛

者喜值胎也 產經云治數落胎方 作大麥鼓羹食即安

胎 又方取母衣帶三寸燒末酒服即安 錄驗方云治任身數落

胎方 以生鯉魚二斤粳米一升作臠少与溫散之日三過 食兒生



治任婦數落胎方第八

病源論云陽施陰化故得有胎榮衛和則經養固之故胎得安而能成長若血氣虛損者子藏為風令所以數值胎任娠而恒腰痛者喜值胎也

產經云治數落胎方

作大麥豉羹食即安

胎方 又方取母衣帶三寸燒末酒服即安

錄驗方云治任身數落

胎方 以生雞糞二升粳米一升作臛少与溫散之日三過 食兒生

治任婦胎值血不止第九

病源論云任身胎值損經脉故血不止也寫血多者致死

葛氏方云治胎值血露不盡方

蘇葉半升 酒四升煮取

一升分服之

桂要方云治胎值血不止方

丹參 十二兩

酒五升煮取三升

分三服即止

又方阿膠

五兩

于地黄

五兩

以酒五升煮取

一升半空分再服

今案博濟安衆方云藥各二兩酒二

升煮取一升

字治本無此注方區等有三

僧深方云生薑切五升以水八升煮取三升

分服 撰集要方云烏翼毛燒三指撮著酒服

治任婦值胎腹痛方第十

病源論云值胎之時餘血不盡故令腹痛

葛氏方云治

值胎後心腹絞痛方

三升

生薑

五兩

葱白 十四枚

酒六升煮取三升分三服之

千金方云治落胎後腹痛

方 地黄汁八合酒五合煮一分三服

僧深方云治值身血不盡去留苦煩滿方

香豉一升半以

水三升煮三沸滴取汁內成末麻角一方寸匕須臾血下煩止

金換牛 金方云

麻角 一兩

治任婦胎上迫心方第十一



酒六升煮取三升分三服之

千金方云治落胎後腹痛

方 地黄汁八合酒五合煮一分三服

僧深方云治墮身血不盡去留苦煩滿方

香豉一升半以

水三升煮三沸滴取汁內成末麻角一方寸匕須臾血下煩止

金檢千金方云

麻角一兩

治任婦胎上迫心方第十一

葛氏方云治任身胎上迫心方

取芎藭急帶之立愈

又方生麴半斤碎水和絞取汁三升分三服之

楊氏產乳云兼下血麴半餅

又方生薑搗絞取三升膠

四兩蜜

四兩合煎取一升五合頓服之

治任婦漏胞方第十二

病源論云漏胞者謂任娠數月經水時下也亦名胞祖漏血晝則斃

醫門方云夫漏胞者任娠下血如故血下不絕胞乾便死宜急治方

生地黃汁一升酒五合和煮一沸分二服

脈廣利方同之

百一方云酒曰合

三五沸不止又服

又云療任娠下血如月水未若胞乾非祇致胎

亦損其母方

干薑

干地黄各五兩末酒服一匙日夜三四服即止

金檢集驗方云干地黄四兩干姜三兩酒服方寸

葛氏方云任身月水不止名為漏胞治之方

何膠干地黄

各五兩

酒五升煮取一升半末食溫再服

千金方云任身

血下不止方

艾生艾葉一升

酒五升煮取二升分二服各用莖

又方燒

秤錘令赤內酒中沸定出錘飲之

集驗方云治任身血下不止盡子死方

干地黄搗末以三指撮酒服不過再三服之

產經云治任身血出不止方

干地黄

十兩

以酒三升煮取二升分二服食

又方突胞門

十壯開元

左右各二寸是也



血下不止方

生艾葉

一介酒五升煮取二升分二服各用鹽

又方燒

秤錘令赤內酒中沸定出錘飲之

集驗方云治任身血下不止盡子死方

干地黄搗末以三指撮酒服不過再三服之

產經云治任身血出不止方

干地黄

十兩

以酒三升煮取二升分二服食

又方炙胞門

十壯

開元

左右各二寸是也

治任婦下黃汁方第十三

子母秘錄云任婦下黃汁如膠及小豆汁方

糯米一升黃耆

各兩

右二物切以水七升煮取三升分四服之

產經云搗地黄取汁

以酒令煎頓服之

治任婦頓作舉重去血方第十四

錄驗方治任身頓作舉重去血方取淡竹折頭燒中央以器並取汁一

升飲之

僧深方云治任身由於頓作及舉重去血方

搗黃連下所以酒服方寸匕三乃止

又方取新生青竹薄剉取青

皮以好酒外和三合許一服之便愈又作

治任婦卒走高墮下血方第十五

產經云治任身婦人卒貢起從高墮下暴去血數斗馬通湯方

馬通汁三合

銕取

干地黄

當歸

各二兩

阿膠

四兩

艾葉

三兩

是

右五物切以水五升煮得二升半去滓內膠更上火令滓分三服大食

馬通湯

是也

治任婦為男所動欲死方第十六

產經云治任身為夫所傷動欲死方

取竹瀝汁半飲升則愈不效後作

千金方云

醫門方云若因房室下血名曰傷胞治之方



馬通計三合

干地黄

當歸

何膝

芍藥

右五物切以水五升煮得二升半去滓內膠更上火令滓分三服食

馬通計

治任婦為男所動欲死方第十六

產經云治任身為夫所傷動欲死方

取竹瀝汁計與飲非則愈不效後作

千金方云

醫門方云若因房室下血名曰傷胞治之方

乾地黄十兩末酒服方寸匕日三夜一若腹內冷加乾薑服之

治任婦胸煩吐食方第十七

產經云任身胸中煩熱嘔吐而不飲食之輒吐出用諸藥无利唯

服牛乳則愈方

牛乳微之煎如酪煎法適寒溫服之多少任

意初服少之若減之良驗

治任婦心痛方第十八

病源論云心痛者多是因風邪痰飲乘心之經故也

舊氏方云刮取青竹皮以水煮令濃絞去滓服三升良

香豉方云高梁薑

三兩以水五升半煮取半升去滓分三服

千金方云燒味束二七枚末以尿服之立驗

又方蜜一升和井底泥

之心下 又方破鷄子一枚和酒服之

僧深方云吳茱萸五

合以酒煮三沸分三服

桂葉方云燒熅令赤熅三指椒酒

服之立免

治任婦心腹痛第十九

產經云治任身心腹刺痛方

燒味束十四枚治末以小便服之立

驗小呂方

小呂方云治任身心腹刺痛產寶之不可忍方



合以酒煮三沸分三服  
槎要方云燒鹽令赤熱三指撮酒

服之三兔

治任婦心腹痛第十九

產經云治任身心腹痛方  
燒束藥十四枚治末以小便服之立

驗小呂方小呂方云治任身心腹痛產寶之不可忍方

鹽燒令赤熱三指撮酒服之立免

治任婦腰痛方第二十

病源論云任身腰痛者因風邪入於府藏所致  
葛氏方云秤錘燒

正赤以著酒中今三沸出錘飲酒  
又方飲蜜升以井中泥塗心

下良  
集驗方云赤小豆東向戶中吞二十七枚良

產經云葱白當飯切酒五升煎取二升半分再服  
耆婆方

溫令熱布裹于腰之仍傳  
千金方云生地黄三斤搗絞

取汁酒升升合煎減半頓服  
又方服一升蜜良  
又方燒

車釐脂內酒中服之

治任婦腰痛方第二十一

病源論云腎主腰脚風冷來之故腰痛  
小呂方云治任身腰痛背

如折方  
大豆三升以酒三升煎取二升服之食後

大豆一升煮取七合空心服

葛氏方云治任身腰背痛如折方  
末麻角酒服方寸匕日五六

又云葱白煮汁服之驗  
又方膠桂各一尺搗以酒三升煮

得一升去滓盡服  
醫門方云療任娠卒腰痛反覆不得

如折方  
鹿角一枚五寸截之燒令赤內酒二大升中浸之冷又

燒之如此數度便空服飲此酒產寶云酒二升酒稠



如折方 大豆三升以酒三升煎取二升服之食後

大豆一升煮取七合空心服

葛氏方云治任身腰背痛如折方 未麻角酒服方寸匕日五

又云葱白煮汁服之驗 又方膠桂各一尺搗以酒三升煮

得一升去滓盡服 醫門方云療任娠卒腰痛反覆不得

如折方 鹿角一枚五寸截之燒令赤內酒二大升中浸之冷又

燒之如此數度便空服飲此酒極佳 產寶云酒二升酒稠

僧深方云治任身腰痛方 葵塹令契布裹与麝之雜者

主之

治任婦脹滿方第二十二

產經云治任身卒心腹物急痛脹滿氣逆少腹起上衝心煩起欬死是

水飲食氣所為伏苓湯方 伏苓 一兩 當飲 三兩 甘草 二

兩 黃芩 一兩 木 三兩 石膏 一枚 如雞子 杏仁 廿枚 夕藥 二兩 芒消 一

右九物切以水八升煮取三升內芒消上火令沸之服一升當下

水或吐便解 又云治任身腰痛心胸脹滿不調安胎當飲丸

方 干薑 下 當飲 二合 芍藥 二兩 膠 四兩

右四物下新蜜丸如小豆服五丸日三

治任婦體腫方第二十三

病源論云此由藏府之間有停水而任娠故 錄驗方云治任身

體腫方 生鯉魚一頭長二尺完用水二斗煮取五升食魚飲

汁 又方葵子一升伏苓三兩下新蜜方寸匕先食日三升便利

即止 醫門方云治任身四支並腫皮肉急方 常陸根切 一升

赤小豆 三升 桑根白皮切 一升 水一斗二升煮二味取七升去滓內

小豆煮令熟然食豆湯飲汁小便利即差 千金方云治任身



錄驗方云治狂身

生鯉奠一頭長二尺完用水二斗煮取五升食奠飲

又方葵子一升伏苓三兩下節煎服方寸匕先食日三升小便利

商  
常陸根切 一升

水一斗二升煮二味取七升去滓內

千金方去治任身

乾  
海  
石

三味水三升煮取一升頓服之

又方大廉子六分搗研以水和麵伏以付腫上燂又付

耆婆方 玄小豆五升 好豉三升 以水一斗 煮取三升 分二服之

大豆二升酒三升煮取二升頓服之

呂任婦下利方第二十四

當飲三

如鷄子大二枚

又云治任身下利

千薑  
二吳

黃蘗 一兩

醫門方彙

阿瞞笑若

又去療任媒利白膿  
股內瘡

冰六升七升煮取二升半分三

千金方云白楊皮一升水一斗煮取二升分三服

又方燒中衣帶三寸末服之



在七物下... 蜜和丸... 梧子一服五九日三... 醫方云療

任娠注下利不止或水腫血方熱... 二兩石榴皮 阿膠炙者三兩

水中外煮取一升半分三服之 又云療任娠利白膿服內含

干薑四兩 赤石脂二兩 棟米一升 水六升煮取二升半分三

服之 千金方云白楊皮一升水一斗煮取二升分三服

又方燒中衣帶三寸末服之

治任婦小便數方第二十五

病源論云腎氣通於陰腎虛而生熱之則小便滋數

錄驗方云治任身卒暴小便數不能自禁止方

桑螵蛸十四枚凡一物作散溫酒服之為再服 產經同之

產經書云十二枚米飲下 楊氏產乳同

治任婦尿血方第二十六

病源論云尿血者有熱氣乘於血之得熱故尿血

產經云治任身溺血方 取其小甲及髮燒作末酒服之又方龍

骨治下三指撮先食酒服日三 又方鹿角屑一兩 大豆卷二兩

桂心一兩 三味下篩酒服方寸匕日三 葛氏方云治任

身尿血方 取黍葉燒末服方寸匕日三 千金方云酒服

治任婦淋病方第二十七

病源論云任身之人胞繫於腎之患虛熱成淋謂之子淋

錄驗方云葵子一升以水三升煮取二升分再服亦切根用之

千金方云 子根一把 千金方云葵子伏苓各一兩

為散水方寸匕日三 醫明方云治任娠患淋小便滋水道熱不

通痛方車前子五兩 葵子一升 水五升煮取一升半分二服

梅師方云



治任婦淋病方第二十七

病源論云任身之人胞繫於腎二患虛熱成淋謂之子淋

錄驗方云葵子一升以水三升煮取二升分再服亦切根用之

千金方云子根一把

千金方云葵子伏苓各一兩

為散水方寸匕日三服醫門方云治任娠患淋小便澀水道熱不

通痛方車前子五兩

葵子一升水五升煮取一升半分二服

梅師方云根切一升

產經云任身小便不利方

葵子一升榆皮一把

以水二升合煎三沸去滓服一升日二三

又方滑石以水和

泥於脊中厚二寸食

新集要方云取東流水浴不得食

慎之大吉

治任婦遺溺方第二十八

產經云治任身遺溺方

取胡鷲櫟中草燒末服半錢上水

酒无在

又方龍骨治末三指撮先食酒服日三

又方

白斂

夕藥

各十分

治下酒服方寸匕日三

治任婦霍亂方第二十九

產經云治任身霍亂寸草湯方

甘草

二兩

厚朴

三兩

乾薑

二兩

當歸

二兩

右四味切以水七升煮取二升

分三服日三

今案博濟安泉方藥合各一兩水三升

煎取一升分三四服

桂要方云任娠飲食不銷成

霍亂心腹脹大吐胸心

條

厚朴湯方

當歸

四兩

人參

三兩

厚朴

三兩

芒口

二兩

干薑

二兩

以水九升煮取二升半分

三服羸人分四服

治任婦瘕方第三十



剪取一升分三四服

桂要方云任娠飲食不銷成

霍亂心腹脹大吐胸心

疾

厚朴湯方

當歸

四兩

人參

厚朴

三兩

芒口

二兩

干薑

二兩

以水九升煮取二升半分

三服羸人分四服

治任婦瘕方第三十

產經云恒山

一兩

耳菖

半兩

枳子

二兩

葱白

四株

凡四物水五升煮取二升末煮服一升臨發後服一升自新

斷

僧深方云竹葉一升

細切

恒山

一兩

細切

水一斗半煮竹葉取七升半

內恒山漬一宿明旦煮取二升半再服先發一時一服臨發一服盡

去竹葉內恒山

集驗方云恒山

二兩

甘草

一兩

岑

三兩

馬梅

十四枚

石膏

八兩

碎累

凡五物以酒一升半

水一升半合漬藥一宿煮三四沸去滓初服六合後服四合

後服二合凡三服

今案海安泉方

傳

恒山

二兩

甘草

半兩

黃芩

半兩

馬梅

兩半

石膏

半兩

酒一升浸一宿煮十

數沸去滓分三四服之

治任婦溫病方第三十一

產經云治任身溫病可服藥方

取竹瀝二升煎之

減半適寒溫服之立愈良

又方以井底泥塗病處良

又方以人尿塗隨其痛處良

治任婦中惡方第三十二

產經云治任身中惡心腹暴痛遂動胎少腹急

當取

葱白

湯方

當取

四兩

人參

二兩

厚朴

二兩

葱白

一席

膠

二兩

芍

二兩



減半適寒溫服之立愈良

又方以井底泥塗病處良

又方以人尿塗隨其痛處良

治任婦中惡方第三十二

產經云治任身中惡心腹暴痛遂動胎少腹急

當取白湯葱白湯方

當取蜀人參二兩

厚朴二兩

葱白一兩膠二兩芎二兩

右六物以水七升煮取二升半分三服之

又方吳茱萸酒

方 吳茱萸五合以酒三升煮三沸分三服良

治任婦教嗽方第三十三

產經云治任身教逆若傷寒教嗽人參湯方 人參 甘草

各一兩 生薑五兩 大棗十枚 凡四物切以水四升煮取一升

半分二服良

治任婦特病令子不落方第三十四

千金方云竈中黃土水和塗新方五寸干漫塗之 又鉗清

和塗之和酒塗並良今案葛氏方云 葛氏方云取井中泥之心

下三寸

治任婦日月未至欲產方第三十五

小品方云鵝卵和蜜為丸如梧子服一丸痛不止更服一丸

崔崔 崔侍郎方云戶根下土五三指撮酒服之

治任婦胎死不出方第三十六

小品方云治月未足胎死不出母欲死方

子母秘錄二升格濯

之 葛氏千金方同之 楊氏產乳之



治任婦日月未至欲產方第三十五

小呂方云鵝卵母和蜜為丸如梧子服一丸痛不止更服一丸  
崔  
崔侍郎方云戶根下<sup>土</sup>五三指撮酒服之

治任婦胎死不出方第三十六

小呂方云治月未足胎死不出母欲死方

子母秘錄二升格濯

之  
葛氏千金方同之  
楊氏產乳之  
大豆三升濃汁

大豆醋煮服三升死兒立出合二服之三升損眼

又方桃白皮如梧子大服一丸立出

又方好書墨三

寸末損眼之

又方燻一升鷄子二枚攪損眼

又方瞿麥一把煮令二三沸<sup>飲</sup>損其汁立產一方下蒜服方寸

貝<sup>心</sup>千金方濃汁服之  
不可實眼

醫門方云療胎死腹中不出其母欲絕方

水銀二兩吞之兒立出

又方伏龍下 下蒂三指撮

以酒服即出

產經云治任身子死腹中不出方

又云周德成婦懷身八月狀<sup>取赤重牛膝根碎以沸湯浸之飲汁兒立出</sup>久氣緣之其腹中兒背折胎死復中

三月困舊方

取黑大豆一升熬以清酒一斗漬之須臾

擇去豆可得三升汁損眼即下胎

子母秘錄云姪姪

胎死腹中<sup>瞿</sup>唯麥一把水五升煮二升汁服

治任婦欲去胎方第三十七

產經云治任身胎二三月欲去胎方

大麦麵五升以清酒一

斗合煎令三沸去滓分五服當<sup>宿</sup>不食服之其子即墮腹中

母不疾千金不易

千金方同之

小呂方云任身欲去子

方  
栝樓 三兩

致 一升 桂 三兩

以水四升煮取一

外八合分三服

又方附子二枚治作屑以淳苦酒和塗

左足心即去大食驗

又云婦人得溫病欲去腹中胎方取鷄子一



產經云治任身胎二三月欲去胎方

大麥麵五升以清酒一

斗合煎令三沸去滓分五服當<sup>宿</sup>不食服之其子即墮腹中令

母不疾千金不易 千金方同之

小呂方云任身欲去子

方 栝樓 三兩

致 一升 桂 三兩

以水四升煮取一

升八合分三服

又方附子二枚治作屑以淳苦酒和漉

左足心即去大食驗

又云婦人得溫病欲去胎中胎方取鷄子一

枚和之以三指撮熅量鷄子中服之立出

又方取井底泥手

書其腹立<sup>出</sup>心神良

千金方云任身得病妄煩去胎方

麥薺子 一升 末和蜜一升服之神效

葛氏方云或不以理欲

去胎方 班苗燒末服一枚即下

錄驗方云煮牛<sup>膝</sup>根

服之

如意方云去胎術

以守宮若蛇肝醯和漉<sup>膝</sup>有

子即下永無後有

又方煮桃根令極濃以浴及漬<sup>膝</sup>胎下

槌要方云任娠欲去胎方

瞿麥 半升

桂心 三兩

蟹爪 一升

牛<sup>膝</sup> 五兩

右以水三升酒五升煮取三升分三服之

又云去胎後血下衝心方

生薑切五升以水八升煮

取三升分三服之

治任婦中蠱方

子母病錄云鼓皮燒治末服方寸匕須臾自<sup>出</sup>蠱主姓名



